

Документ подписан проставлен
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 02.07.2025 11:27:41
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Оценочный материал для диагностического тестирования

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Поликлиническая и неотложная педиатрия, СЕМЕСТР 10

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Детских болезней
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-6 ПК-2	Укажите один правильный ответ 1. Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют лечащие врачи, работающие в	а) государственной системе здравоохранения; б) муниципальной и частной системах здравоохранения; в) государственной, муниципальной и частной системах здравоохранения, на основании лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности г) станции скорой медицинской помощи	низкий
ОПК-6 ПК-2	Укажите один правильный ответ 2. Как долго наблюдаются дети новорожденные и грудного возраста из 4-ой группы риска?	а) 1 месяц; б) 3 месяца; в) 6 месяцев; г) 1 год д/с «Д» учета не снимаем.	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите один правильный ответ 3. Частота проведения анализов крови недоношенному ребенку на первом году жизни	а) в 1 месяце и по показаниям б) в 1 месяц и 1 раз в квартал в) ежемесячно до 1 года г) в 1 месяц и в 1 год	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите один правильный ответ 4. Кратность осмотра неврологом недоношенного ребенка на первом году жизни	а) 1 раз в месяц б) 1 раз в квартал в) не менее 2-х раз в год г) по показаниям	низкий

ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите один правильный ответ 5. Укажите возрастные границы ребенка для постановки вакцины АКДС	а) с 3 мес до 1 г 6 мес б) с 4,5 мес до 2 л 6 мес 3) с 3 мес до 3 лет 4) с 3 мес до 3 лет 11 мес 29 дней	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите все правильные ответы 6. К наиболее характерным признакам спазмофилии относят:	а) гипокальцимию б) гипофосфатемию в) снижение уровня паратиреотропного гормона г) судороги	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 7. Абсолютным противопоказанием к введению АКДС является	а) прогрессирующие заболевания ЦНС б) острые заболевания и обострения хронических заболеваний в) заболевания свертывающей системы крови г) чрезмерно сильная реакция или осложнения на предыдущую вакцинацию д) заболевания сердца, ВПС	средний
ОПК-6 ПК-2	Укажите все правильные ответы 8. Какие из нижеперечисленных вакцин являются инактивированными	а) АКДС б) БЦЖ в) коревая г) ИПВ д) АДС-М е) АДС ж) гриппозная назальная	средний
ОПК-6 ПК-2	Укажите все правильные ответы 9. Укажите схему вакцинации и против вирусного гепатита В	а) 0 (первые сутки) б) 3 мес. в) 1 мес. г) 1 год д) 6 мес.	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 10. Перечислите симптомы характерные для острого течения рахита:	а) размягчение краев родничка б) Гаррисонова борозда в) лоб олимпийца г) квадратная голова д) искривление нижних конечностей: Х и О - образное е) рахитические четки ж) нити жемчуга з) запавшая переносица	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 11. Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком не выдается:	а) за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении б) за хроническими больными в период ремиссии в) если ребенку исполнилось 15 лет г) в период ежегодного	средний

		оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы; д) в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет е) если возраст ребенка от 7 лет и старше	
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите все правильные ответы 12. Перечислите формы медицинской документации, где производят фиксацию данных о проведенных профилактических прививках:	а) ф 112/у б) ф 058/у в) ф 030/у г) ф 063/у д) прививочный паспорт е) ф 026 /у ж ф 003/у	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 13. Перечислите категории детей, по уходу за которыми лист временной нетрудоспособности выдается на весь период заболевания	а) дети до 7 лет б) дети до 14 лет включительно в) дети в возрасте до 18 лет, инфицированные вирусом иммунодефицита человека в период совместного пребывания родителя с ребенком на стационарном лечении г) дети в возрасте до 18 лет при болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями при лечении в амбулаторных условиях д) дети в возрасте до 18 лет при болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, злокачественными новообразованиями при лечении в условиях стационара е) дети до 15 лет	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите все правильные ответы 14. Критерии выписки недоношенного ребенка на участок из роддома, отделения выхаживания недоношенных.	а) масса тела 1500-2000 г., б) масса тела 2000-2500 г., в) масса тела 2500 г. и больше, г) отсутствие острых заболеваний, д) удовлетворительный соматический статус	средний
ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9	Укажите все правильные ответы 15. Анамнестические признаки, отражающие сведения за прошедший период:	а) материальный уровень семьи б) степень адаптации к режимам в) полнота семьи г) вскармливание, вопросы питания д) прививки и реакция на них	средний
ПК-6 ПК-9	Укажите все правильные ответы 16. Наиболее важными, из	а) сохраняются оральные рефлексы, угасли защитный,	высокий

ПК-10	перечисленных признаков нормального НПР 3-х месячного ребенка являются: (выберите 3 из них)	рефлексы опоры и автоматической походки, появился рефлекс Ландау, б) угас гипертонус мышц во всех конечностях в) тянет предметы в рот, тянется к игрушке г) смеется, криком выражает неудовольствие д) узнает близких, отличает плачем от чужих	
ОПК-9 ОПК-10	Соотнесите: 17. На основании анамнестических данных определите группы направленного риска и соотнесите риски (признаки) в соответствии с номерами групп риска: На амбулаторном приеме мать с мальчиком 7 месяцев. Масса при рождении – 3200 г, длина тела – 52 см, привит по календарю. Ребёнок от второй беременности, протекавшей с: А. краевым предлежанием плаценты, анемией с 24 недель. Мать ребёнка по поводу анемии не лечилась. Б. Во время беременности на 13 неделе перенесла ОРВИ. В. К груди приложен через 2 часа после рождения. Г. Семья полная. Материальная обеспеченность семьи удовлетворительная. Проживают в однокомнатной квартире 4 человек, отец курит. 3 группа 4 группа 5 группа		высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Закончите предложение 18. Реактивная краснота кожи, возникающая после удаления первородной смазки, первой ванны, называется		высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Закончите предложение 19. На 1 ставку врача педиатра приходится,,,,,,,,		высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Закончите предложение 20. При оценке НПР ребенка 1 г, 6 м. на основании оценки основных линий развития: С – из предметов разной формы по		высокий

	предлагаемому образцу и слову подбирает предметы такой же формы; О – движения более координированы – перешагивает через препятствие приставным шагом; И – умеет воспроизводить часто наблюдаемые в жизни действия (причёсывает, умывает); Ра – в момент заинтересованности называет предметы; Рп – находит по слову среди нескольких сходных предметов по цвету, размеру и пр.; Н – самостоятельно ест густую пищу ложкой, просится на горшок. Выставляется группа НПР.....		
--	--	--	--

Поликлиническая и неотложная педиатрия, СЕМЕСТР 12

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Детских болезней
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-6 ПК-2	<i>Укажите один правильный ответ</i> 1. К какой группе здоровья относится ребенок из неблагополучной семьи (алкоголизм родителей, неполная семья и др.)?	а) 1 группа здоровья б) 2 группа здоровья в) 3 группа здоровья г) 4 группа здоровья д) 5 группа здоровья	низкий
ОПК-6 ПК-2	<i>Укажите один правильный ответ</i> 2. Назовите срок первичной вакцинации АКДС и против полиомиелита недоношенного ребенка, родившегося массой до 1500 г.	а) 3 мес б) 6 мес. в) 9 мес. г) 12 мес. д) после 1 года	низкий

ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите один правильный ответ 3. Длительность основного курса – I этапа, купирующей ферротерапии пероральными препаратами железа в среднем составляет: а) 3-4 недели б) 6-10 недель в) 12-24 недели	а) 3-4 недели б) 4 – 8 нед в) 6-10 недель г) 12-24 недели	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите один правильный ответ 4. Продолжительность периода определения толерантности к пище при гипотрофии II степени составляет	а) 1-2 дня б) 3-7 дней в) 10 дней г) до 14 дней	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите один правильный ответ 5. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ ЯЛЯЕТСЯ	1) Klebsiella 2) Serratia 3) Pseudomonas spp 4) Escherichia coli 5) Staphylococcus saprophyticus	низкий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите все правильные ответы 6. Критериями изучения и оценки НПР новорожденного ребенка являются:	а) навыки б) анализаторы зрительный, слуховой в) рефлексy, мышечный тонус г) эмоции д) практические действия	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 7. При спазмофилии после оказания неотложной помощи в терапии используют:	а) препараты кальция внутрь б) хлористый аммоний 10% раствор, 1 ч.л. 3 раза в день в) витамин D 4000 МЕ ежедневно с 4-5 дня г) оксibuтират натрия 50-100 мг/кг д) витаминотерапию	средний
ОПК-6 ПК-2	Укажите все правильные ответы 8. Какие из нижеперечисленных вакцин являются живыми	а) АКДС б) БЦЖ в) коревая г) ОПВ	средний
ОПК-6 ПК-2	Укажите все правильные ответы 9. Укажите декретированные сроки вакцинации и ревакцинации против кори	а) 6 мес. б) 12 мес. в) 18 мес. г) 3 года д) 6 лет	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 10. Какой кашель характерен для острого обструктивного ларинготрахеита?	а) сухой б) влажный в) приступообразный г) лающий д) надсадный е) больше утром ж) в течение дня з) ночной	средний

		и) болезненный	
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 11. Назовите заболевания, для которых характерна инспираторная одышка?	а) острый бронхит б) острая пневмония в) инородное тело бронха г) обструктивный ларинготрахеит д) приступ бронхиальной астмы е) заглочный абсцесс	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите все правильные ответы 12. 5. Основные симптомы скарлатины:	а) тонзиллит б) «малиновый» язык в) мелкоточечная сыпь на гиперемизованном фоне г) крупно-точечная сыпь на обычном фоне д) энантема е) бледный носогубный треугольник	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Укажите все правильные ответы 13. Для II стадии (декомпенсации) астматического состояния характерны	а) учащенное шумное дыхание б) потеря сознания в) большое количество сухих и влажных хрипов г) отсутствие дыхательных шумов в отдельных сегментах д) понижение артериального давления е) острая сердечная недостаточность ж) диффузный цианоз кожи и слизистых з) страх удушья	средний
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Укажите все правильные ответы 14. Какие параклинические методы используют для диагностики хронического гастродуоденита:	а) рентгенография желудка б) УЗИ печени в) фракционное дуоденальное зондирование г) фракционное исследование желудочного сока д) рентгенологическое исследование в условиях искусственной гипотонии е) гастродуоденофибро-скопия	средний
ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-9	Укажите все правильные ответы 15. Характерными клиническими признаками первичной лактазной недостаточности являются	а) частый стул б) стеаторея в) пенистый стул г) водянистый стул д) кислый запах стула е) метеоризм ж) зловонный стул з) боли в животе после приема молока	средний
ПК-6	Укажите все правильные ответы	а) антигистаминные	высокий

ПК-9 ПК-10	16. Для лечения геморрагического васкулита используются препараты (выберите 4 из них)	б) дицинон в) преднизолон г) эpsilon-аминокапроновая кислота д) антиагреганты е) гепарин ж) факторы свертывания крови	
ОПК-9 ОПК-10	Укажите все правильные ответы 17. Распределите отделы дыхательного тракта	1. верхние (А,Г) 2. средние (Б,Е,Ж) 3. нижние (В,Д) А. нос Б. гортань В. бронхиолы Г. глотка Д. альвеолы Е. трахея Ж. долевые и сегментарные бронхи	высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Закончите предложение 18. Проведение во время профилактического медицинского осмотра детей: лабораторной диагностики, антропометрии, плантографии, измерения АД относится к -		высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10	Закончите предложение 19. Сууставной синдром при острой ревматической лихорадке характеризуется		высокий
ПК-6 ПК-9 ПК-10 ПК-11	Выберите правильную комбинацию ответов 20. Укажите, медиаторами аллергии какого типа являются следующие бав:	1. Гистамин 2. Фактор, угнетающий миграцию макрофагов 3. Гепарин 4. Хемотаксический фактор для макрофага 5. Фактор, активирующий макрофаги (ФАМ) А. I типа Б. IV типа	высокий