

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 27.08.2025 12:18:50
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bf0cf976

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Электромагнитные поля и волны, 4 семестр

Код, направление подготовки	11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Направленность (профиль)	Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Радиоэлектроники и электроэнергетики
Выпускающая кафедра	Радиоэлектроники и электроэнергетики

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	По закону полного тока $\text{rot}\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{J}^{\text{св}}$ (первое уравнение Максвелла) источниками вихревого магнитного поля являются вектор объемной плотности тока ...	1) стороннего электрического 2) тока поляризации 3) смещения 4) проводимости 5) стороннего магнитного	низкий
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Согласно первому уравнению Максвелла изменение электрического поля во времени порождает _____ магнитное поле.	1) гармоническое 2) вихревое 3) скалярное 4) нулевое 5) постоянное	низкий
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	В системе уравнений Максвелла закон электромагнитной индукции в интегральной форме записывается уравнением ...	1) $\oint_l \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{J} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} + \vec{J}^{\text{св}} \right) d\vec{S}$ 2) $\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$ 3) $\oint_l \vec{E} d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{B} d\vec{S}$ 4) $\int_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V (\rho + \rho^{\text{св}}) dV$	низкий
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Установите соответствие между фамилиями ученых и их вкладами в развитие науки	А) _____ ление об электрическом и магнитном поле;	низкий

	1) Майкл Фарадей 2) Жан Френель 3) Джеймс Максвелл 4) Генрих Герц	Б) Создал теорию электромагнитного поля; В) Установил законы изменения поляризации волны при ее отражении и преломлении; Г) Обнаружил на опыте электромагнитную волну	
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Плоскость, проходящая через нормаль к поверхности раздела двух сред и направление распространения падающей волны, называется плоскостью	1) преломления 2) вектора Н 3) отражения 4) поляризации 5) вектора Е 6) падения	низкий
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	При падении волны произвольной линейной поляризации на границу раздела сред в общем случае отраженная волна имеет	1) нормальную линейную поляризацию 2) эллиптическую поляризацию 3) круговую поляризацию 4) правую круговую поляризацию 5) параллельную линейную поляризацию	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	В формуле коэффициента прохождения $\tau = \frac{2Z_2 \cos \varphi}{Z_1 + Z_2 \cos \varphi}$ величина φ - это	1) фаза отраженной волны 2) угол отражения 3) угол падения 4) угол преломления 5) фаза преломленной волны 6) фаза падающей волны	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Идеальный диэлектрик это среда с проводимостью	1) $\sigma=0,1$ См/м 2) $\sigma=6,1 \cdot 10^7$ См/м 3) $\sigma \rightarrow \infty$ 4) $\sigma=0$ См/м	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Векторное материальное уравнение $\vec{D} = \epsilon_a \vec{E}$ в линейной, однородной, изотропной среде эквивалентно скалярным уравнениям	1) $D_y = \epsilon_a E_y$ 2) $D_z = \epsilon_a E_z$ 3) $D_x = \epsilon_a E_x$ 4) $D_z = \epsilon_a E_y$ 5) $D_y = \epsilon_a E_x$	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Относительная ϵ и абсолютная ϵ_a диэлектрические проницаемости среды связаны соотношением	1) 2) $\epsilon = \epsilon_0$	средний

		3) $\epsilon = \sqrt{\epsilon_a \epsilon_0}$ 4) $\epsilon = \epsilon_0$	
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Электромагнитная волна, у которой векторы поля E и H имеют постоянные фазы на плоскости, ортогональной направлению распространения, называется	1) синфазной 2) плоскостной 3) ортогональной 4) ортогональной	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Соотношения, показывающие связь между значениями составляющих векторов электромагнитного поля в разных средах у поверхности раздела – это условия.	1) полевые 2) граничные 3) поверхностные	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Скорость перемещения фронта волны называется _____ скоростью.	1) фазовой 2) амплитудной 3) циклической 4) угловой	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Силовые линии электрического поля _____ к поверхности идеального проводника.	1) Перпендикулярны 2) Наклонны 3) Параллельны 4) Касательны	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Соотношения, связывающие попарно векторы E и D, H и B в средах – это уравнения	1) векторные 2) материальные 3) интегральные 4) дифференциальные	средний
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Векторы $\vec{J}_{ст}$ и \vec{E} ортогональны, при этом мощность стороннего источника $\int_V (-\vec{J}_{ст} \vec{E}) dV$ равна	1) нулю 2) бесконечности 3) мощности поля	высокий
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Коэффициент ϵ_a в материальном уравнении $\vec{D} = \epsilon_a \vec{E}$ это _____ среды	1) абсолютная магнитная проницаемость 2) оптическая плотность 3) абсолютная диэлектрическая проницаемость 4) удельная плотность 5) удельная проводимость	высокий
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Комплексный вектор Пойнтинга $\vec{\Pi} = \frac{1}{2} [\vec{E}, \vec{H}]$ величина чисто вещественная при сдвиге фаз между E и	1) $\pi/3$ 2) 0 3) $2\pi/3$ 4) $-2\pi/3$	высокий

	Н	5) $\pi/2$	
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Волна в среднем за период колебаний не переносит мощность, если	<p>1) действительная часть комплексного вектора Пойнтинга равна бесконечности</p> <p>2) мнимая часть комплексного вектора Пойнтинга равна нулю</p> <p>3) действительная и мнимая части комплексного вектора Пойнтинга равны</p> <p>4) действительная часть комплексного вектора Пойнтинга равна нулю</p>	ВЫСОКИЙ
ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5	Среднее за период колебаний значение вектора Пойнтинга связано с комплексным вектором Пойнтинга соотношением	<p>1) $\vec{\Pi}_{cp} = Im\vec{\Pi}$</p> <p>2) $\vec{\Pi}_{cp} = Re\vec{\Pi} + Im\vec{\Pi}$</p> <p>3) $\vec{\Pi}_{cp} = \vec{\Pi}$</p> <p>4) $\vec{\Pi}_{cp} = Re\vec{\Pi}$</p> <p>5) $\vec{\Pi}_{cp} = Re\frac{1}{2}[\vec{E}, \vec{H}]$</p>	ВЫСОКИЙ