

Документ подписан электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 22.07.2025 08:04:30
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa10d107074f998099d3d6bfdcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

ФТИЗИАТРИЯ, 9 СЕМЕСТР

Код направления подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Многопрофильной клинической подготовки
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	Укажите один правильный ответ 1. При постановке пробы Манту используется туберкулин в дозе:	А. 1 ТЕ Б. 2 ТЕ В. 5 ТЕ Г. 20 ТЕ Д. 100 ТЕ	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	Укажите один правильный ответ 2. Вакцинация и ревакцинация в России проводится методом:	А. скарификации (накожно) Б. внутрикожного введения вакцины В. подкожного введения вакцины Г. внутримышечного введения вакцины Д. перорального введения вакцины	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ 3. Для своевременного выявления туберкулеза необходимо проводить:	А. массовые профилактические обследования населения на туберкулез Б. обследование на туберкулез больных в общих и специализированных лечебных учреждениях В. регулярное и качественное обследование групп риска по туберкулезу Г. санитарно-просветительную работу с населением Д. все перечисленное	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2	Укажите один правильный ответ 4. Основным методом выявления туберкулеза у детей является:	А. флюорография Б. бактериология В. рентгенография Г. иммунодиагностика Д. ультразвуковая диагностика	низкий

ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3			
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3	Укажите один правильный ответ 5. Препарат, которым проводится вакцинация и ревакцинация БЦЖ, - это:	А. туберкулин ППД-Л Б. альтуберкулин Коха В. туберкулин в стандартном разведении Г. вакцина БЦЖ	низкий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3	Укажите все правильные ответы 6. В понятие очага туберкулезной инфекции следует включить:	А. больного, выделяющего МБТ Б. жилище больного, выделяющего МБТ В. Прилегающую к дому уличную территорию Г. окружение больного, выделяющего МБТ	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	Укажите все правильные ответы 7. Картина спинномозговой жидкости более характерная для туберкулезного менингита:	А. высокое содержание белка Б. Преобладание нейтрофилов С. умеренный цитоз (200–400 клеток и более) Г. снижение сахара и хлоридов Д. преимущественно лимфоцитарный Е. Высокий Цитоз (более 1000 кл.)	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-7.1 ОПК-7.2	Укажите все правильные ответы 8. Какой характер туберкулиновых реакций у детей с поствакциной аллергией?	А. пробы имеют тенденцию к уменьшению в следующие годы Б. интенсивность проб увеличивается в течение 2-х лет В. положительные туберкулиновые пробы возникают у детей после вакцинации Г. диаметр папулы обычно более 12 мм	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	Укажите один правильный ответ 9. К социальным факторам, благоприятствующим распространению туберкулеза, относятся:	А. неблагоприятные жилищно-бытовые условия Б. материальная необеспеченность В. низкий интеллектуальный уровень Г. Сопутствующие заболевания	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10	Укажите все правильные ответы 10. При дифференциации	А. наличие или отсутствие прививки БЦЖ Б. срок, прошедший после	средний

ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3	послевакциной и инфекционной аллергии приходится учитывать:	прививки БЦЖ В. наличие и размер послевакцинного знака Г. Сопутствующие заболевания Д. сведения о контакте и симптомы, подозрительные на туберкулез;	
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	<i>Укажите все правильные ответы</i> 11. Для дифференциальной диагностики туберкулеза легких и пневмонии можно провести пробное лечение с использованием на первом этапе:	А. амоксицилин Б. бисептола В. цефтриаксона Г. изониазида Д. рифампицина	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-7.1 ОПК-7.2	<i>Укажите все правильные ответы</i> 12. Выберите относительные противопоказания для вакцинации БЦЖ:	А. Недоношенность 2 степени Б. Генерализованная инфекция БЦЖ у других детей в семье В. гемолитическая болезнь новорожденных средне-тяжелой степени Г. ВИЧ-инфекция у матери Е) внутриутробные инфекции	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> 13. Выявление заболевания туберкулезом у взрослых осуществляется методами:	А. по обращаемости за медицинской помощью в связи с появлением клинических признаков болезни Б. методом массового флюорографического обследования населения В. по материалам биопсии (инструментальное обследование, операция) Г. Массовой иммунодиагностикой Д. на секционном столе	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	<i>Укажите все правильные ответы</i> 14. Наиболее часто обнаруживают микобактерии в	А плевральной жидкости Б. промывных водах желудка В. мокроте Г. промывных вод бронхов	средний
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3	<i>Укажите все правильные ответы</i> 15. Рентгенологическую картину свободного костодиафрагмального выпотного плеврита характеризуют симптомы:	А. высокая интенсивность тени, убывающей к периферии Б. расположение тени в нижних отделах грудной полости В. косая направленность верхней границы тени Г. неоднородная структура тени Д. смещение средостения в здоровую сторону Е. Фокусная тень	средний
ОПК-4.2	<i>Выберите правильную</i>	А. а,б,в	высокий

ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	комбинацию ответов 16. Наиболее часто туберкулез легких у взрослых локализуется: а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5 Е) 6 сегментах;	Б. а,б,е В. Б, г,д Г. а,б,г	
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	Выберите правильную комбинацию ответов 17. В каких отделах легких чаще расположена диссеминация при туберкулезе: а) верхних б) нижних в) средних	А. а,б Б. а,в В. б,в Г. а,в	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	Сделайте заключение 18. У ребенка с впервые положительной реакцией Манту с 2 ТЕ обнаружен малоструктурный корень легких справа. Клинических симптомов заболевания не выявлено. О каком заболевании следует в первую очередь подумать?	Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-7.1 ОПК-7.2 ОПК-8.1 ОПК-8.2 ОПК-8.3 ОПК-8.4 ОПК-7.3	Сделайте заключение 19. У ребенка 6-ти летнего возраста наблюдается следующая динамика туберкулиновых реакций по пробе Манту с 2ТЕ-ППД-Л по годам: 1 год - 11 мм. 2 года - 9 мм. 3 года - 5 мм. 4 года - 2 мм. 5 лет - отр. БЦЖ - рубчик 7 мм. Оцените реакцию на туберкулин.	Вираз туберкулиновой пробы	высокий
ОПК-4.2 ОПК-4.3 ОПК-5.10 ОПК-6.1	Дополните: 20. Препарат, которым проводится вакцинация и ревакцинация БЦЖ, - это	вакцина БЦЖ	высокий