

Документ подписан простой электронной подписью  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 16.06.2026  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

## Оценочный материал для диагностического тестирования

### Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

#### Общая хирургия, 6 семестр

Код, направление подготовки	31.05.01
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Хирургических болезней
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите один правильный ответ</b> 1. Хирургического лечения может потребовать паразитарное заболевание, вызванное:	1. аскаридами; 2. лямблиями; 3. актиномицетами; 4. цистицерком; 5. острицами.	Низкий уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите один правильный ответ</b> 2. Рак (карцинома) – это злокачественная опухоль, развивающаяся из:	1. соединительной ткани; 2. железистой ткани; 3. эпителия.	Низкий Уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите один правильный ответ</b> 3. Клинико- морфологические признаки злокачественной опухоли все, кроме:	1. наличия капсулы; 2. инфильтративного роста; 3. полиморфизма строения;	Низкий уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите один правильный ответ</b> 4. Укажите симптом, не наблюдающийся при травматическом вывихе плеча:	1. боль в плечевом суставе; 2. резкое ограничение движений в суставе; 3. деформация и припухлость сустава; 4. крепитация при пальпации головки плеча; 5. пружинящая фиксация плеча при попытке движений в суставе.	Низкий уровень

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите один правильный ответ</b> 5. Для глубоких ожогов характерно фазовое течение раневого процесса. Исключите неверно указанную фразу:	1. омертвление ткани в момент ожога ; 2. серозное асептическое воспаление; 3. реактивный травматический отек; 4. гнойное демаркационное воспаление; 5. регенерация.	Низкий уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 6. Из чего получают фибриноген?	1. Из плазмы крови. 2. Из эритроцитов. 3. Из тромбоцитов. 4. Из костного мозга.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 7. Отечность, цианоз, наличие пузырей со светлой жидкостью характерно для отморожения:	1. первой степени; 2. второй степени; 3. третьей степени; 4. четвертой степени.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 8. Что не относится к лабораторным признакам массивной кровопотери:	1. Уменьшение количества гемоглобина. 2. Повышение гематокрита. 3. Снижение гематокрита. 4. Уменьшение количества эритроцитов.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 9. Отморожение – это повреждение тканей при действии:	1. высоких температур; 2. умеренных температур; 3. низких температур.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 10. Для свежей раны характерно все, кроме:	1. боли; 2. кровотечения; 3. подергивания мышц; 4. зияния.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 11. При вторичном заживлении ран различают все основные этапы, кроме:	1. рассасывания погибших клеток и сгустков крови; 2. первичной склейки (фибрином); 3. развития грануляций; 4. рубцевания и эпителизации.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b>	1. иссечение краев и дна раны; 2. вскрытие карманов и затеков;	Средний уровень

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	12. Под первичной хирургической обработкой раны следует понимать:	3 удаление гнойного отделяемого; 4 иссечение краев, стенок и дна раны; 5 промывание раны антисептиком; гемостаз.	
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 13. Что не относится к общим симптомам острого массивного кровотечения:	1.Снижение артериального давления. 2.Слабость, головокружение. 3.Истечение крови из раны. 4. Тахикардия. 5.Бледность и влажность кожных покровов.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 14. Чем отличается поздняя первичная хирургическая обработка от вторичной хирургической обработки?	1. техникой операции; 2. сроками операции; числом предыдущих перевязок; 3. отсутствием первичной хирургической обработки; 4. применением дренирования или отказом от него.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 15. Оптимальные условия для развития газовой гангрены возникают при:	1. закрытых переломах; 2. механических повреждениях кожных покровов; 3. ожогах II-IV степени; 4. отморожениях II-IV степени; 5. укусах насекомых.	Средний уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 16. Для предупреждения регургитации во время вводного наркоза необходимо:	1. ввести атропин; 2. опустить головной конец; 3. миорелаксанты вводить медленно; 4. проводить принудительную вентиляцию мешком перед интубацией; 5. применить прием Селлика.	Высокий уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 17. Какая операция не выполняется в ранние	1. вскрытие флегмоны; 2. рассечение надкостницы; 3. трепанация костно-мозговой полости;	Высокий уровень

ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	сроки при остром остеомиелите?	4. секвестрэктомия; 5. костная пластика.	
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 18. Преимуществом эндотрахеального метода анестезии является:	1. создание оптимальных условий для работы хирурга; 2. обеспечение проходимости дыхательных путей; 3. предупреждение развития бронхоспазма; 4. предупреждение остановки сердца; 5. обеспечение хорошей аналгезии.	Высокий уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 19. К возбудителям хирургического сепсиса не относятся:	1. кишечная палочка; 2. гемолитический стрептококк; 3. золотистый стафилококк; 4. протей; 5. синегнойная палочка.	Высокий уровень
ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-3.1 ПК-3.2 ПК- 3.3 ПК-3.4 ПК-5.1 ПК- 5.2 ПК-5.4 ПК-8.2	<b>Укажите все правильные ответы</b> 20.Преимущество внутривенной                    общей анестезии состоит в том, что:	1. не требуется сложной аппаратуры; 2. отсутствует стадия возбуждения; 3. быстрое введение в наркоз; 4. взрывобезопасность; 5. все ответы правильные.	Высокий уровень